

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Amm. refractus</i> , Haan; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 475, pl. 172, fig. 3-7 et <i>Prodr. callovien</i> , n° 47.	Oxf. marn. partie moyenne.	Saint-Brès, au N. sous la route des Vans, T. R. à l'état de fer sulfuré.
<i>Amm. Cristolii</i> , Jules Beaudouin, <i>Bul. Soc. géol. de France</i> , 2 <sup>e</sup> sér., t. VIII, p. 587, pl. x, fig. 1, 2.	Oxford. 2 <sup>e</sup> étage.	Les Martines, près Anduze, au pied de Lacan. T. R. un seul exemplaire.
<i>Amm. Henrici</i> , d'Orb., <i>Pal. franç.</i> , 1, pl. 198, fig. 1, 2 et <i>Prodr. oxf.</i> , n° 43.	Oxf. marn. et passage des marnes au calcaire.	Naves (Ardèche), R. à l'état ferrugineux.  Cazalet.
<i>Amm. Eucharis</i> , d'Orb., 1847, <i>Pal. fr.</i> , 1, pl. 198, fig. 3, 4 et <i>Prodr. oxfordien</i> , n° 44. Syn.: <i>A. depressus</i> , Pusch, 1837, pl. 13, fig. 6, non Sowerby.	Oxf. marn. partie moyenne et 2 <sup>e</sup> étage.	Saint-Brès, au N. de la route des Vans, C.; — Naves (Ardèche), C., à l'état ferrugineux.  Cazalet, C.
<i>Amm. perarmatus</i> , Sow., 1822, <i>min. conch.</i> , pl. 352; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 498, pl. 184, 185, fig. 1-3 et <i>Prodr. oxford.</i> , n° 35.	Oxford. 2 <sup>e</sup> étage.	Cazalet; — Sumène; — Ganges; — Rogues; — la Tessonne, au-dessus de la Paro; — Naves (Ardèche), R.
<i>Amm. canaliculatus</i> , Münster. 1830; Ziet., d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 129 et <i>Prodr. oxford.</i> , n° 36.	Oxford. 2 <sup>e</sup> étage.	Cazalet?; — Pierremorte; — Vissec; — Rogues; — la Tessonne, au-dessus de la Paro (Lioüire); — Naves (Ardèche). C.
<i>Amm. taticus</i> , Pusch, 1837; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, pl. 180, et <i>Prodr. oxford.</i> , n° 38.	Oxf. 2 <sup>e</sup> étage et oxford. marn. partie moyenne.	Cazalet; — Pierremale, près Monac; — Sumène; — Naves (Ardèche); — Vissec (Lioüire). R. Saint-Brès, sur la route des Vans; — Naves; Joyeuse. à l'état ferrugineux. A. C

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Amm. Toucasianus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, pl. 190 et <i>Prodr. oxfordien</i> , n° 41.	Oxford. 2° étage.	Cazalet; — Pierremorte; — Naves; — Sumène; — Bois de la Tessonne, au-dessus de la Paro. T. R.
<i>Amm. dimorphus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 410, pl. 141 et <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 39.	Oxford. 2° étage.	Rogues. T. R.
<i>Ammonitoceras Calloviensis</i> , Morris, <i>ann. et mag. nat. hist.</i> , 5, p. 32, pl. 6, fig. 3; d'Orb., <i>Prodr. callovien</i> , n° 63.	Marnes oxford.	Les Vans (Ardèche) T. R.; — Saint-Brès (le frère Euthyme); — Courry, sous l'église (le frère Euthyme); — La Tessonne (Lioûre).

### Mollusques Gastéropodes.

<i>Purpurina</i> .....	Corallien.	Col de Ferrières, commune de Pompignan, T. R. (un seul ex. collect. Lioûre).
<i>Purpurina Lapiérrea?</i> , Buv., Meuse, pl. 30, fig. 15.	Corallien.	Col de Ferrières (exempl. unique, collect. Lioûre).
<i>Nerinea Bernardiana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 112, pl. 264, fig. 1-3 et <i>Prodr. corallien</i> , n° 40.	Corallien.	Bois de Mounier, près Pompignan; — Au col de Ferrières (Lioûre).
<i>N. Sequana</i> , Thirria <i>Jahrb.</i> 7; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 124, pl. 269, fig. 3-4, et <i>Prodr. corall.</i> , n° 28.	Corallien.	Bois de Mounier, un seul exempl.
<i>N. DeFrancei</i> , Desh., <i>moll. de Moree</i> , 3, p. 186, pl. 26, fig. 1-2; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 108, pl. 262, fig. 1-2 et <i>Prodr. corall.</i> , n° 53.	Corallien.	Bois de Mounier.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>N. depressa</i> , Voltz, <i>Jahrb.</i> , p. 540; Bronn., p. 550, pl. 6, fig. 17; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 104, pl. 259, sous le nom de <i>N. umbilicata</i> , d'Orb. et <i>Prodr. coral.</i> , n° 56.	Corallien.	Bois de Mounier (collect. Liouère, un seul exempl.)
<i>N. dilatata</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 146, pl. 278, fig. 1-3.	Corallien.	Bois de Mounier, au col de Ferrières. (collect. Liouère, un seul exempl.)
<i>N. Moreauiana?</i> , d'Orb. 1841, <i>Rev. zool.</i> , p. 319 et <i>Prodr. corall.</i> , n° 30.	Corallien.	Col de Ferrières, au bois de Mounier. T. R.
<i>Natica Dejanira?</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 296, fig. 1-2, et <i>Prodr. corall.</i> , n° 90.	Corallien.	Col de Ferrières, au bois de Mounier. T. R. (un seul exempl. en mauvais état, coll. Liouère).
<i>Natica</i> . . . . ?	Corallien.	Col de Ferrières. T. R. (un seul exempl. dans la collect. Liouère).

### Mollusques Lamellibranches.

<i>Pecten dentatus?</i> , Sow., 1827, 6, p. 143; Quenst., p. 758, pl. 92, fig. 3, et d'Orb., <i>Pr. Bajoc.</i> , n° 422.	Corallien.	Séranne (Hérault).
<i>Spondylus velatus</i> , Goldf., 1836, 2. p. 94, pl. 105, fig. 4 = <i>Hennites velatus</i> , d'Orb., <i>Prodr. oxford.</i> , n° 445.	Oxfordien.	Séranne (Hérault).
<i>Pecten globosus</i> , Quenst. <i>Jura</i> , pl. 92, fig. 20.	Corallien.	Bois de Mounier.
<i>Pecten</i> . . . .	Oxford.	Naves (Ardèche).