

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Anc. Clareti</i> , P. de Rouville, <i>Mém. de l'Acad. des Sc. de Montpellier</i> , t. III, p. 228, pl. II, fig. A et A'.	Etage 3.	Claret, (département de l'Hérault).
<i>Baculites neocomiensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 138 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 66.	Etage 2.	Mons, d'après Renaux; — Puechredon à 1 kilomètre S.-E. du château, (deux petits fragments, coll. Liouère). T. R.

### Mollusques Gastéropodes.

<i>Eulima</i> .....	Etage 4.	Bois de la Chaux (arrondissement d'Uzès).
<i>Nerinea gigantea</i> , d'Hombre-Firmas, 1838, <i>rec. de mém. et d'obs.</i> , 4 <sup>e</sup> part. <i>Hist. nat.</i> pl. v; — d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 158 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 665.	Etage 4.	Montagne du serre de Bouquet, du côté de Brouzet; — carrières au-dessus de Navacelle; — Arlinde, (coll. de Malbos à Privat). T. R.
<i>Nerinea Archimedi</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , p. 78, pl. 158, fig. 3-4 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 666.	Etage 4.	Bois de la Chaux (arrondissement d'Uzès), recueilli par M. Brunel, agent - voyer à Uzès, 1855.
<i>Natica Bruguerii</i> , Math., 1843, <i>Cat.</i> , p. 230, pl. 39, fig. 1; — d'Orb., <i>Prodr. néoc.</i> , n° 113.	Etage 3.	Lussan, au hameau de Beth; revers Est du serre de Bouquet, au-dessous des ruines du château. T. R.
<i>Natica prœlonga</i> , Desh.; Leymerie, <i>Mém. de la Soc. géol.</i> , t. v, pl. 16, fig. 8, p. 13; — d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , <i>terr. crét.</i> , 2, p. 152, pl. 172, fig. 1. et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 111.	Etage 3.	Commune des Plans, au quartier du bois, (coll. Liouère); — Serre de Bouquet, revers Est, sous les ruines du château, R.; — entre Arlinde et Allègre, C.; — Sébenc, R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Natica Hugardiana</i> , d'Orb., 1842, <i>Pal. fr., terr. crét.</i> , 2, p. 151, pl. 171, fig. 2 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 110; = <i>Natica pseudo ampullaria</i> , Math., 1843, <i>cat.</i> , p. 229, pl. 38, fig. 16.	Etage 3.	Commune des Plans, au quartier des bois, (coll. Lioure) T. R.; — commune de Sauve, à Sébenc, T. R.
<i>Natica bulimoides</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 172, fig. 2-3; = <i>N. Allan-densis</i> , Math., 1842, <i>Cat.</i> , p. 229, pl. 38, fig. 17.	Etage 3.	Lavalus, (coll. Lioure) T. R.; — entre Allègre et Arlinde; — Lussan, hameau de la Lecque. (ces deux derniers exemplaires douteux).
<i>Pleurotomaria neocomiensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 188, fig. 8-12 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 141.	Etage 3.	Sébenc, commune de Sauve, à l'état de moule intérieur. T. R. — La Lecque, commune de Lussan.
<i>Pleurotomaria Pailletteana</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 189 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 142.	Etage 3.	Environs de Quissac, à l'état de moule intérieur. T. R.
<i>Strombus Sautleri</i> , Coquand, <i>Mém. de la Soc. d'émulation du Doubs</i> , année 1859.	Etage 1.	Plaine de Pompignan, au quartier de Pied-Boisson. R. — trouvé par M. Lioure.
<i>Pterocera Pelagi</i> , d'Orb., 1843, <i>Pal. fr., terr. crét.</i> , 2, p. 304, pl. 212; et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 156.	Etage 3.	Connaux, sur la montagne de Sarcin T. R.
<i>Pterocera</i> ....	Etage 4.	Bois de la Chaux (arrondissement d'Uzès) rec. par M. Brunel.
<i>Dentalium neocomiensis</i> , Nobis.	Etage 3.	Percée du chemin de fer, à Ners.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<b>Mollusques Lamellibranches.</b>		
<i>Panopæa irregularis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 352, fig. 1-2 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 196.	Etage 3.	Montlança, près le hameau de Suzon, commune de Bouquet, (à l'état de moule intérieur, coll. Liouère). T. R.
<i>P. neocomiensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 353, fig. 3-8; — <i>Pholadomya neocomiensis</i> , Leymerie, <i>Mém. de la Soc. géol. de Fr.</i> 1 <sup>re</sup> série, t. v, pl. 3, fig. 4.	Etage 3.	Sébenc, à l'état de moule intérieur. T. C.
<i>Panopæa Voltzii</i> , d'Orb., <i>Prodr. néoc.</i> , n° 202. = <i>Lutraria Voltzii</i> , Math., <i>Cat.</i> , p. 139, pl. 12, fig. 2-3.	Etage 3.	Sébenc (coll. Liouère).
<i>P. Urganensis</i> , d'Orb., 1847, <i>Prodr. néoc.</i> , n° 203; Matheron, <i>Cat.</i> , p. 139, pl. 12, fig. 1.	Etage 3.	Sébenc, (coll. Liouère).
<i>P. Massiliensis</i> , d'Orb., 1847, <i>Prodr. néoc.</i> A; n° 204, réunissant les <i>Lutraria cuneata</i> et <i>L. Massiliensis</i> , Math., <i>Cat.</i> , p. 140, pl. 12, fig. 4-9.	Etage 3.	Sébenc (coll. Liouère).
<i>Lutraria sinuosa</i> , Matheron, p. 138, pl. 13, fig. 5-6.	Etage 3.	Sébenc.
<i>Pholadomya elongata</i> , Münster, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 362 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 209.	Etage 3.	Sébenc (coll. de Malbos, à Privas); — Sampzon; — Mont de Sarcin, près Connaux. — Rocher de la ville d'Arles, (coll. Renaux). R.
<i>Pholadomya Malbosi</i> , Pictet, 1867, <i>Mél. Pal.</i> , 2 <sup>e</sup> livraison, pl. 19, fig. 3.	Etage 1.	Beaulieu, près de Bérias (Ar-dèche).