

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Terebratulina biauriculata</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 502, fig. 3-7 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 422.	Étages 1          et 2.	Montée de Fontanil, près Pompignan, sur le chemin de grande communication de Saint- Hippolyte à Montpellier, borne kilométrique n° 4, à gauche en montant dans la tranchée de la route. Dans les assises min- ces, marneuses qui séparent les bancs calcaires; — Four à chaux d'Enval, à Pompignan; — Puechredon, à 1 kilomètre au S.-E., (coll. Lioüre).
<i>Terebratula Tamarindus</i> , Sow.; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, pl. 505, fig. 1-10, et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 423.	Étage 3.	Lavalus (coll. Lioüre); — Lussan, au hameau de Beth. A. R.
<i>Ter. proclonga</i> , Sow., d'Orb., <i>Pal.</i> <i>fr.</i> , 4, p. 506, fig. 1-7, et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 425.	Étage 3.	Lavalus, (coll. Lioüre) R. Lussan. R.
<i>Ter. Carteroniana</i> , d'Orb., <i>Pal.</i> <i>fr.</i> , 4, pl. 507, fig. 1-5 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 428.	Étages 3          et 2.	Sebenc, commune de Sauve; — Lussan quartier de la Bertra- nette, et au hameau de Beth; — au hameau de la Lecque; — Lavalus (coll. Lioüre); — Samp- zon (Ardèche). — Le mont Saint-Jean, versant Nord, près Pompignan (coll. Lioüre).
<i>Ter. marcousana</i> ??, d'Orb., <i>Pal.</i> <i>fr.</i> , 4, pl. 507, fig. 11-14 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 430.	Étage 3.	La Bédosse, près Alais, (coll. Lioüre) T. R.
<i>Ter. semistriata</i> , DeFrance; d'Orb.. <i>Pal. fr.</i> , 4, pl. 508, fig. 1-11 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 431.	Étage 2. Partie supérieure.	Le hameau de Gaujac, com- mune de Saint-Théodorit. (coll. Lioüre) T. R.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<b>Ter. hippopus</b> , Roemer; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, pl. 508, fig. 12-18 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 432.	Etage 1.	Montée de Fontanil, près Pom-pignan. A. C.
<b>Ter. diphyoides</b> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, pl. 509 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 747.	Etage 1.	Mons, T. R. ; — Brissac , près Ganges (Hérault) T. R. un seul exemplaire recueilli par M. Boutin ; — Bérias (Ardèche). T. C. Cette belle espèce se trouve très-abondamment sur toute la lisière méridionale du bois de Païolive, dans un triangle compris entre les Gélis, Bérias et la Maisonneuve. — Chomérac (Ardèche) ; — Gigondas (Vaucluse), réc. par M. Eugène Raspail.
<b>Ter. Moutoniana</b> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, pl. 510, fig. 1-5 et <i>Prodr. urgonien</i> , n° 748.	Etage 3.	Saint-Côme (arrondissement de Nîmes), quartier de la côte de Bertrand ; — Mirabel, au mont Saint-Jean, base de l'étage marneux ; — Puechredon, à 1 kilomètre au Sud-Est, partie inférieure de l'étage marneux. R. — Colombeyrolles, près Saint-Théodorit, partie supérieure des marnes ; — Salle-de-Gours, aux carrières, (coll. Liouère) A. C. — Cette espèce est citée à tort dans le <i>Prodrome</i> par d'Orbigny, comme se trouvant à Bérias dans l'étage urgonien. Elle est au contraire caractéristique de la partie inférieure de l'étage des calcaires à <i>Toxaster complanatus</i> .
<b>Ter. sella</b> , Sow. ; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 4, pl. 510, fig. 6-12 et <i>Prodr. urg.</i> , n° 749.	Etage 3.	Lussan, quartier de la Bertranette et au hameau de Beth, C. ; — Bouquet, au pied des ruines du château, C. ; — Vagnas (Ardèche) réc. par le frère Euthyme. — C'est proba-

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
		blement par erreur que d'Orbigny cite cette espèce dans l'étage urgonien où nous ne l'avons jamais rencontrée.
<i>Terebratella</i> , plusieurs espèces.	Etage 1.	Carrières de Salle-de-Gours (coll. Lioûre). T. R.
<i>Thecidea tetragona</i> , Rocmer; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 522, fig. 1-7.	Etage 1.	Montée de Fontanil, récolté par M. Lioûre. R. valves supérieures.
<i>Crania</i> .... ?	Etage 2.	Près Pompignan, une seule valve supérieure (coll. Lioûre), côte d'Artigue, T. R.
<i>Requienia ammonia</i> , Math., 1843, <i>Cat.</i> , pl. 1-2; = <i>Chama ammonia</i> , Goldf., pl. 138, fig. 8; <i>Caprotina ammonia</i> , d'Orb., <i>Bull. de la Soc. géol.</i> , 1842 et <i>Prodr. urg.</i> , n° 752.	Etage 4.	Très-abondante partout où existe le 4 <sup>e</sup> étage : dans l'arrondissement d'Alais, à Saint-Ambroix, au serre de Bouquet, au Puech, commune de Rochegude, etc..... Dans l'arrondissement d'Uzès, à Montclus, Laval-Saint-Roman, Saint-André-de-Roquepertuis, Serviers, quartier de la Garriguette, Dions; dans l'arrondissement de Nîmes à la montagne du bois des Lens; — dans l'Ardèche, à Vallon, au pont d'Arc.
<i>Req. carinata</i> , Matheron, <i>Cat.</i> , pl. 2, fig. 1-5; = <i>Capronita Lonsdalii</i> , d'Orb., <i>Prodr. urg.</i> , n° 753.	Etage 4.	Dans les mêmes localités, mais beaucoup plus rare que la précédente.
<i>Caprotina trilobata</i> . d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 582.	Etage 4.	Saint-Ambroix, au bois de la Ville; — Arlinde, réc. par le frère Euthyme; — Saint-Marcel-de-Carciret. Plus rare que les espèces précédentes.