

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Diceras arietina</i> , Lamk.	Corallien.	Bois de Mounier; — col de Ferrières; col de l'Ermitage. T. C.
<i>D. Münsteri?</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 373.	Corallien.	Bois de Mounier; — col de Ferrières et col de l'Ermitage.
<i>Lima</i>	Oolite infér. sous-étage b.	Anduze, à l'Arbousset.
<i>Lima cardiformis</i> , <i>Plagiostoma cardiformis</i> , Sow., 1815; d'Ord., <i>Prodr. callov.</i> , n° 203.	Ool. infér.	Roc de la Fourque à Madières (collection Lioûre).
<i>Lima</i> 2 espèces.	Ool. infér.	Alzon, dans le lit de la rivière de Vis, au-dessous du chemin de Vissec (collect. Lioûre).
<i>Inoceramus</i>	Oxf. 2 ^e étage.	Cazalet (un seul exempl., coll. Lioûre).
<i>Pholadomya clathrata</i> , Goldf., p. 157, fig. 5; d'Orb., <i>Prodr. oxford.</i> , n° 204.	Oxf. infér. au contact de la dolomie.	Rogues; — Tessonnes, au-dessus de la Paro. T. R. (2 exempl., coll. Lioûre).
<i>Pholadomya fidicula?</i> , Sow., pl. 225; d'Orb., <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 229.	Ool. infér. sous-étage a.	Alzon, lit de la Vis. T. R. (un seul exempl., coll. Lioûre).
<i>Panopaea Jurassi</i> , d'Orb., <i>Prodr. Bajoci.</i> , n° 209; Goldf., pl. 152, fig. 7. — <i>Myopsis Jurassi</i> , Agass., 1845. <i>Etudes crit.</i> , p. 255, pl. 30, fig. 3-10.	Ool. infér. sous-étage a.	Alzon, R. (coll. Lioûre).
<i>Ostrea</i>	Corallien.	Logis du Bos (Hérault).
<i>Lyonsia abducta</i> , d'Orb., <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 244.	Oolite infér.	Alzon, T. R. (un seul exempl., coll. Lioûre).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
Astarte..... (à l'état de moule).	Ool. infér. Sous-étage a.	Alzon, A. C. (coll. Lioûre).
Trigonia.... (à l'état de moule).	Ool. infér. sous-étage a.	Alzon, T. R. (coll. Lioûre).
Mytilus Sowerbianus, d'Orb., 1847, <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 378 = <i>Modiola plicata</i> , Sow., 1819. <i>Min. conch.</i> , pl. 248.	Ool. infér.	Alzon, dans le lit de la Vis, sous le chemin de Vissec.
Corbis decussata?, Buvignier, <i>Mém. de Verdun</i> , t. 2, p. 4, pl. 3, fig. 13-17; d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 274; Syn : <i>Corbis Buvignieri</i> , Desh.	Corallien.	A l'état de moule assez imparfait, T. R. (collect. Lioûre).

Mollusques Brachiopodes.

Terebratula Buckmanni, Davidson.	Ool. infér. sous-étage a.	Madières, rive droite de la Vis; — Tavillon et mas de Bos, près Anduze; — Monoblet; — Caze-vieille. T. C.
Ter. globata, Sow., <i>M. conch.</i> , pl. 436, fig. 1 et <i>Ter. bullata</i> , <i>idem</i> , pl. 435, fig. 4 = <i>Ter. Kleinii</i> , Lamk; d'Orb., <i>Prodrome Bajocien</i> , n° 450.	Ool. infér. Sous-étage a.	Roc de la Fourque (Madières), T. R. (un seul exempl. coll. Lioûre).
Ter. nucleata, Schl.; Zieten, 1830, <i>Petref.</i> p. 53, pl. 39, fig. 10; d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 389; Quenst., <i>Jura</i> , p. 638, pl. 79, fig. 12-16.	Oxf. 2 ^e étage partie inférieure.	Montée de Saint-Brès, sur la route des Vans; — Rogues; — Vissec; — Tessonnié; — Sumène. A. C.; — Cazalet, T. R.
Ter. insignis, Schübler; d'Orb., <i>Prodr. Corall.</i> , n° 387.	Corallien.	Col de l'Ermitage, près Pompiagnan. A. R. (coll. Lioûre); — la Séranne (Hérault).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Ter. sphæroidalis</i> , Sow., <i>M. c.</i> , pl. 435, fig. 3; d'Orb., <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 449 = <i>Ter. bullata</i> , Zieten, non Sow.	Calc. oxford.	Tessonne, au-dessus de la Paro. A. R. (coll. Lioûre).
<i>Ter. bicanaliculata</i> , Schlot.; Zieten, 1830, p. 54, pl. 40, fig. 5; d'Orb., <i>Prodr. callov.</i> , n° 245.	Oxf. marneux et Oxford. ét. 2.	Valatoujès; — Fonsanche; — Saint-Brès. Pic d'Angeau, près le hameau de Faugères; — au-dessous de la ferme de l'Euze, Séranne (Hérault).
<i>Ter. bisuffarinata</i> , Zieten; Syn.: <i>T. bicanaliculata</i> , Schl.; d'Orb., <i>Prodr. callov.</i> , n° 245.	Corallien.	Col de l'Ermitage, commune de Pompignan, R. (coll. Lioûre).
<i>Ter. Rupellensis?</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 392.	Corallien.	Col de Ferrières, commune de Pompignan, R. (coll. Lioûre), et col de l'Ermitage.
<i>Ter. perovalis?</i> , Sow., <i>M. conc.</i> , p. 436, fig. 2, 3, 4, 5, 6, d'Orb., <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 452.	Ool. infér. siliceuse.	Le Bos, près Anduze, T. C.; — Figaret, près Saint-Hippolyte, dans la dolomie; Cazevieille (Alzon).
<i>Ter. bivallata</i> , Eugène Deslonch., 1859, <i>Note sur les brach. du callov. de la Voulte</i> , etc...., p. 7, pl. xi, fig. 1, 2.	Marnes oxf. partie infér.	Saint-Brès, quartier de Monchaud, près de Dieuse. A. R.
<i>Ter. Repeliana</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 394.	Corallien.	Bois de Mounier, près Pompignan, A. C. — Séranne, au sommet, en face de l'Escoutet, R.
<i>Ter. fimbria</i> , Sow., <i>Min. conch.</i> , pl. 326; d'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 460.	Ool. infér.	Saint-Brès, près le hameau de Dieuse, T. R.
<i>Ter. quadriplicata</i> , Zieten, <i>Wurtemb.</i> , p. 55, pl. 41, fig. 3 = <i>Rhynchonella quadriplicata</i> , d'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 438.	Ool. infér. sous-étage b.	Saint-Brès, C., se trouve aussi dans le callovin de Saint-Brès.